

貓咪帶回家最重要的事

貓咪兩個月就如同人的小嬰兒，需要細心照顧，不是放著會吃會玩就是好主人

小貓保暖工作很重要，因無法維持自身體溫（請買溫度計放在養小貓的只想或籠子附近測量室溫），冬天氣溫在 **29°C 以下** 需使用電暖墊＋布做保溫（溫度控制在 29°C～32°C）；夏天太熱在室內若溫度在 **32°C 以上**，請用電風扇吹牆面或天花板保持空氣流暢，不要直接吹小貓易受寒（有時有午後雷陣雨，溫度遽降須注意），晚間下班要開冷氣請開 28°C～29°C 就好，夏天 34°C～35°C 沒開冷氣把貓熱得半死，晚上主人回到房間又開 24°C～25°C 冷氣，這樣溫差近 10°C，這樣溫差大易感冒。

先開幼貓罐頭給幼貓吃，試試看是否有胃口（罐頭不太吃可能因為陌生而不主動進食，可以先把手洗乾淨後，用手抓一點放進其嘴巴，讓貓咪聞到好吃後就會主動去吃了，需要持續個 5 至 10 次小小口的餵食）。

※**不吃**→如果活潑度正常，那就是換環境在鬧脾氣不肯吃，主人就要用**針筒餵食雞肉泥罐頭**，最好的狀況是 4 小時一次 15～30cc，若要上班就餵食早、晚、宵夜就好，一次 25～50cc（寵物貓牛奶＋奶瓶也可），出門上班上課，可放約 20 幾顆飼料在碗裡當零嘴給貓咪吃（針筒藥局有賣，買 1cc 的最佳，其次是 3cc 的針筒）。

※**有吃**→如果食欲正常也可以試著泡軟飼料 5～10 顆，混在罐頭裡面吃，**罐頭和飼料比約 5:1**，出門上班上課可放 20 幾顆在碗裡面當零嘴給貓咪。

貓咪學吃順序：貓用牛奶→雞肉泥→幼貓罐頭→數顆軟飼料＋罐頭→飼料

※在更新成任何新的食物時請一定要少量約 3cc 內（循序漸進），因為小貓腸胃還沒發育完整前最好少量多餐，別因為小貓貪吃就給他吃太多（容易導致腸胃不適）。

一、貓奶粉及沖泡方法：使用專用貓奶粉（推薦品牌 KMR 和竣寶奶奶），**千萬不能使用人喝的奶粉或鮮奶**，沖泡請用 40°C 左右的溫水，**專用湯匙奶粉比專用湯匙溫水約 1:3**（**拉肚子**請調整成 1:4，**便秘**則調整成 1:2），可加少量酵素，沖泡好的貓奶，如果有剩下也可放在冰箱冷藏（以一次為限），使用前需先隔水加熱，不可以放置於室溫隔餐餵食，以免造成貓咪拉肚子，也切記不可隨便更換貓奶粉品牌造成小貓的適應不良。

若貓咪 40 天以上可以開始吃貓飼料：幼貓必須吃幼貓飼料，**成貓飼料太油並不適合幼貓食用**，幼貓飼料（用熱開水泡軟約 5 分鐘，將多餘水分倒去）比上幼貓罐頭約 5:1，混和著吃（要用的均勻不然小貓只會吃罐頭不吃飼料），8 小時為一次（早、晚、睡前），不可給貓咪吃劣質飼料會影響健康，軟飼料、貓奶、雞肉泥，因裡面含水分不需要另外給水，頂多在吃完飼料後給幾口即可。（喝太多水容易拉稀，且肚子小喝多了就沒有空間放有營養成分的飼料），除非貓咪開始吃硬飼料，才無上限供應水分。

二、餵食次數與份量：建議**剛出生兩周**的餵奶貓，約 2～4 小時餵食一次，每次

約 3~15cc 左右或以上；**兩周大至一個月約 3~5 小時**餵食一次，每次約 15~45cc 左右或以上；**一個月以上約 6 小時**餵食，一次約 45~60cc 左右或以上，並考慮誘導吃一些不同的食物，例如：嬰兒泥、泡軟飼料、幼貓罐頭，貓奶或雞肉泥等同飼料數類，飼主可自己選擇餵食哪幾種方式，看貓咪喜歡吃哪種，每隻貓咪喜好不同，需要耐心觀察及誘導飲食。

三、餵食：奶瓶剪口不可太大，餵食動作要和緩，注意貓咪是否有吞嚥，要特別注意不要讓貓咪嗆奶，否則容易造成肺炎而致命，剛剛出生的餵奶貓可使用 1cc 注射針筒（**需去除針頭**）以最慢速度推入餵奶貓口中，餵奶請以少量多餐，因為小貓的腸胃發育不完整，故最好少量多餐，別因為小貓貪吃而吃太多（導致腸胃不順）。

四、排泄：小貓中途離開母貓必須模仿母貓舔舐幼貓的肛門和尿道促使排泄的模式，用濕且溫的衛生紙或面紙輕輕按摩小貓的尿道及肛門（**喝奶前後都要做**）（1~2 天有排便一次為正常），若超過 4 天未排便請尋求獸醫師幫忙，每天觀察他的大便和尿尿是否正常，每天都要抱抱他看看眼睛、耳朵、嘴巴、屁股有無異狀的分泌物，若有就應該立刻反應，倘若貓咪便便是成條但有些水水的為**正常**，因為進食都是水狀食物，**若拉稀像一灘水就需特別注意**可能因為換環境抵抗力下降，需要小心照顧。

五、保溫：餵奶貓無法自己保持體溫，必須靠外在輔助工具，例如：保溫燈、電毯。使用保溫燈時須注意**溫度和距離**，必須有空間讓小貓能因溫度不同而移動；使用電毯時，特別注意電毯上必須鋪有厚被，避免電毯直接跟小貓接觸，使用保溫工具不當可能灼傷小貓或造成小貓脫水。

六、清潔及除蚤：不可以幫餵奶貓洗澡，但可用擦澡或局部清潔來取代，並且必須盡速吹乾；幫餵奶貓除蚤，不可以使用市面上的除蚤滴劑或噴劑，盡量用手抓或蚤梳。

七、就醫：餵奶貓有任何不正常狀況：不喝奶、嘔吐、拉肚子、體溫下降或上升、出血、流口水或鼻水、皮膚異常、精神不濟、眼屎等症狀，請不要遲疑，馬上送至信任的動物醫院進行診斷及醫療（包含夜間急診）。

※台灣天氣潮濕，貓咪容易有黴菌，尤其貓咪開始學吃軟飼料，經常弄得手、臉、腳，甚至可能整個屁股坐進去碗裡面，**用餐完畢一定要擦拭乾淨**，加上換環境抵抗力下降以及偶遇上梅雨季節或午後雷陣雨，除濕機一定要開。

耳朵在台灣這種天氣，無論狗狗或貓咪都是容易得耳疥，不要跟米克斯比，米克斯是油性耳朵。品種貓都是乾性耳朵，乾性耳朵本來就比較需要細心照顧，一星期至少要點 2 次保養用的耳藥；如果有耳疥，就要點治療用的耳藥，天天適當清潔會讓他的耳朵好很快，懶惰就會延長復原的時間。

注意事項 一定不能做的事情

一、一定不能吹風，不能放在家中通風處（小貓很怕風且容易受寒），最好是在房間裡，冬天時籠子外還要蓋上布（蓋3面靠牆面不用）。

二、10天內一定不能洗澡，未施打滿2劑預防針，不建議帶至寵物店美容，因為寵物店進出寵物太多了，所以容易有病菌產生，如有必要至美容院清洗，必須選擇環境，並且當場等候，洗好馬上帶回。

三、預防針未打完3劑盡量避免外出，除了去動物醫院打預防針。

四、預防針沒打完不能接觸任何動物（因為不知道其他動物是否有，未顯示出來的隱性疾病，因為大貓大狗已有相當的抵抗力，就算感冒了，也許也不會表現出來（對大貓大狗來講是不嚴重的，隱性的，可以依靠自己抵抗力恢復的），但是小貓沒有打完疫苗是沒抵抗力的，小小的感冒就容易導致小貓死亡。

五、一定不能亂舔地板（尤其是我們的手指頭，東摸西摸，細菌看不見），請洗手後再跟小貓玩。（如果你覺得地板很乾淨讓小貓舔，那麻煩你自己也舔地板）

六、小貓和嬰兒一樣，出生周數越小，越需要長時間睡眠，所以請讓小貓有充分的休息時間，不要一再的好玩，而不斷的打擾她休息，尤其是剛換新環境的小貓，本身會因為心理因素而影響生理，所以請給予適當的休息時間。最好的狀態是能連續休息4~5個小時以上再出來活動30分鐘即可，如果遇到小貓熟睡狀態，請讓他好好休息，不要吵醒他。

七、保暖方式：冬天在室內，必須特別燈照保暖溫度控制在28-29度之間，買個溫度計放在旁邊，給予布科墊子即可，如果飼養空間比較通風，請在籠子外面蓋個大毛巾，留一小縫面牆壁通風即可；夏天在室內溫度控制在28-29度，請用電風扇吹牆面或天花板保持空氣流通就好，若要開冷氣，請給予布料墊子，並在籠子外面蓋上大毛巾留向牆壁面通風即可。

八、建議預防針尚未打完最好將小貓關籠子，若放出籠子，容易亂舔吃到髒東西然後生病，雖然這樣關著很可憐，但這是健康長大的辦法，換環境對小貓來講會造極大的心理壓力，而導致身體的免疫力降低容易感冒或拉肚子，而體內一些潛在的病毒也易於此時發作，因此在小貓剛換環境的10天內，必須密切的注意貓咪的身體狀況，如果有頻繁的打噴嚏，流眼淚流鼻水，不吃不喝，拉肚子軟便（拉稀像水一樣，並非一條只是有點軟喔），嘔吐或精神不濟的狀況都需要馬上和我聯絡，剛到陌生環境的貓，通常都會因為沒有安全感而緊張，想要躲藏，甚至

出現攻擊性的行為，因此，不論你養的是成貓或者是幼貓，在一開始帶回家的時候，都要先關在籠子內。

- (1) 容易緊張的小貓，先待在自己的小空間觀察周遭會比較不緊張，才不會導致抵抗力下降。
- (2) 有些小貓適應能力強，一下子就習慣環境當自己家了，但放出籠子容易亂舔吃到髒東西，再來舔自己的肛門，細菌從肛門進入會腸道感染導致腸炎再去看醫生就麻煩了，所以請小心照顧。

飼養環境布置

如果貓咪會睡在地板或是角落當然也容易感冒，而且鑽來鑽去眼睛就容易感染（可能是棉絮或是塵蟎）。

可以將飼養鐵籠外面罩上布，布置成貓咪的房間，放好砂盆、食物碗、水碗舒適的小貓床、貓抓板玩具...等等，最好準備一個可以讓貓咪把自己**藏起來**的箱子或有屋頂的貓床。一帶回家先把貓咪帶到砂盆，讓貓咪知道上廁所的地方，人如果在的時候想把貓咪放出來玩是可以的，但是要看著他，要不然要把可能製造危險的東西都要收好，例如：清潔劑、藥品、電線或可能吞入的小東西。可以固定一天 2~3 個小時餵食貓咪培養感情，用罐頭最能打動貓咪的心。

基本用品

食器：我個人是比較偏愛食碗、水碗分開的，水只要路過就會幫他換新的，水的品質會影響貓咪的健康，所以保持良好，乾淨的水質，要煮沸過的冷開水，貓咪喝了比較不會拉肚子。

貓提籃（外出籠）：貓籠是非常重要的用品，帶貓咪出去一定要用提籃裝貓咪，這樣才能保護貓咪的安全，而且我建議買有門的，貓咪比較不會鑽出去，而且隱密性也夠。

貓砂：建議使用粗球沙，小貓還小怕細沙會傷到眼睛，而且粉塵比較重。

貓砂盆、貓蓬：可以視使用的貓沙種類而選擇。

指甲剪：我覺得指甲剪必須要喔！總要自己學習幫貓咪剪指甲，但要小心，不要剪到流血。

貓用洗毛精：台灣氣候較潮濕，黴菌是滿容易發生的事，買黴菌用的洗毛精做預防動作，一個月洗澡一次。

貓抓板：我覺得蠻需要的，不要買巧拼，被抓壞後會有屑屑，貓咪吃進去造成腸阻塞那就糟糕了。

貓床：冬天較需要，夏天應該沒有貓想把自己熱死。（除非家中一直有開冷氣）

化毛膏：貓咪長到 6 個月大後就可以開始吃化毛膏，化毛膏是用來幫助貓咪把胃道內的毛球排出來的食品。

清耳液：貓咪的耳朵要常常清潔，眼睛和耳朵是相通的，耳朵不通眼睛就會流眼淚，建議用藥用的清耳疥的清耳液，可達到預防耳疥蟲之效果。