

# 勁大粒

安全

增產

環保

抗逆

純天然種子萃取  
生物激活素

## 作物及特點：

- 1.是100%來自天然植物種子萃取之成分。
- 2.具有植物訊息傳遞及催化作用。
- 3.可以抗氧化及老化作用，對環境逆境有適應力。
- 4.促進肥料吸收，有促進著果、增大、拉長之效果，因為含有天然激素、維他命、胺基酸、貝他葡聚糖、甜菜精及多醣體。



未施用



施用區



未施用



施用區



未施用



未施用

勁大粒 TONIC 5000X

施用區



未施用



施用區



施用後



施用勁大粒減少胡蘿蔔早疫病之發生



未施用

施用勁大粒



未施用

施用勁大粒



未施用



施用區



未施用

施用後



未施用

施用後

肥料品目(編號)	混合鉀質肥料(3-10)
肥料登記證字號	肥進鉀字第0425035號
廠牌商品名稱	勁大粒
國外廠牌商品名稱	TONIC

### 作用機制

如附圖作物施用後

- 1.傳遞訊息：強化作物的自身防禦機制
- 2.基因：強化自身防禦，整合進細胞的基因記憶中，並抗逆境
- 3.蛋白質和酵素：在第一次使用勁大粒後，植物加強生產防禦蛋白及酵素以更有效地面對逆境
- 4.威脅信號：生物性及非生物性威脅因子啟動植物防禦系統

### 成分及作用

係由紫花苜蓿種子萃取物、剪秋蘿種子萃取物及黃腐酸鉀、檸檬酸鉀之混合成分，含水溶性氧化鉀10.5%



天然生物激活素

生長素刺激細胞增大

維他命

控制作物之抗氧化、老化作用

天然胺基酸  
(貝他葡聚醣、甜菜精)

增加對不穩定環境之抗逆境力

天然之多醣體

增加肥料之吸收及促進著果

### 施用方法

作物	施用時期	稀釋倍數
木瓜、鳳梨	1.開花前後10至15天 2.果實肥大期	5000倍
蘋果、梨、柿、枇杷	1.花芽分化期 2.花謝後20~40天及果實肥大期	5000倍
葡萄	1.開花期前一星期 2.花謝後一星期 3.開始著色	5000倍
棗子、釋迦、蓮霧	1.開花期前一星期 2.花謝後之著果期	5000倍
桃、李、梅	1.花謝後 2.果實肥大期	5000倍
柑桔、芒果	1.發芽期 2.落花後 3.生理落果後 4.果實肥大期	5000倍
果菜類 (番茄、瓜類、豆類、茄子、辣椒、青椒等)	1.移植後五天左右 2.之後每20天施用一次	5000倍
葉菜類、根菜類 (甘藍、芹菜、蘿蔔、馬鈴薯)	1.移植後五天左右 2.以後每20天施用一次	5000倍
草莓	1.移植後五天左右 2.第一次開花前 3.開花後每20天施用一次	5000倍
茶葉、茗葉、檳榔	1.新萌芽發前噴施一次 2.20天後再噴施一次	5000倍
花卉(玫瑰、菊、蘭等)	1.移植後五天左右 2.第一次開花前 3.開花後每20天施用一次	5000倍

### 注意事項

- 1.儲存於陰涼、不結凍之處所5~40°C範圍範圍內
- 2.避免兒童觸及、誤食

製造工廠：韓國生物有限公司

輸入業者：



**日寶生化有限公司**

臺北市昆明街269號1樓 電話：02-2719-9430  
網址：www.twphartr.com.tw

名方公司

搜尋