










矽寶-水梨(PEAR)使用方法-nutrition plan

Field Practices & Growth Stages	Bud Burst 新芽	Pink Bud	Pre-Flowering 開花前	Early fruit Development 幼果期	Mild Fruit Development ~ Harvest 中果期~收成	Post- Harvest 收成後
Major Elements 主要養分	SUPA STAND PHOS 健立保 (7L/公頃)	MAGIC K 保祝勇 (5L/公頃)	MAGIC K 保祝勇 (5L/公頃)	MAGIC K 保祝勇 (5L/公頃)	SUPA K 30 保全鉀 (4L/公頃)	MAGIC K 保祝勇 (5L/公頃)
Trace Elements 次要養分		1.CUPOR K BEST (4L/公頃) 2. SUPA BOR 肥果脆 (2L/公頃)	1. GROCAL MGB 補鈣鎂 (4L/公頃) 2.SUPA BOR 肥果脆 (2L/公頃)	GROCAL MGB (4L/公頃) 補鈣鎂 	GROCAL MGB (4L/公頃) 補鈣鎂	1. SUPA BOR 肥果脆 (2L/公頃) 2.CUPORKBEST (4L/公頃)
Organic Activators 有機質		OM-3 黑三寶 (4L/公頃)	OM-3 黑三寶 (4L/公頃)	OM-3 黑三寶 (4L/公頃)		
Plant Health Separate Appy. 植物保護資材			STAND SKH 矽寶 (3L/公頃)	STAND SKH 矽寶 (3L/公頃)	STAND SKH 矽寶 (3L/公頃)	
Applications 施用次數	14 天 1 次， 共 2 次	1 次	1 次	1 次	14 天 1 次， 共 2 次	1 次

梨之施用法:開花前300CC/分地噴1次,幼果期以300cc/分地噴1次,中果其以300CC/分地每14日噴1次,共2次

矽寶-柑橘(citrus)使用方法-nutrition plan

Field Practices & Growth Stages	Pre & Post Flowering 開花前後	Spring Flush 1 第 1 次抽春梢	Spring Flush 2 第 2 次抽春梢	Early Fruit Development 幼果期	Fruit Fill To Harvest 中果-收成	Post Harvest 收成後
Major Elements 主要養分	SUPASTANDPHOS 健立保 (5L/公頃) 		MAGICK 保祝勇 (5L/公頃)	MAGICK 保祝勇 (5L/公頃)	SUPAK30 保全鉀 (3L/公頃) 	MAGICK 保祝勇 (5L/公頃)
Trace Elements 次要養分	SUPABOR 肥果脆 (1L/公頃) GROCALMGB 補鈣鎂 (2L/公頃)	CUPORKBEST (2L/公頃)	SUPABOR 肥果脆 (1L/公頃) GROCALMGB 補鈣鎂 (2L/公頃)	GROCALMGB 補鈣鎂 (2L/公頃) 	GROCALMGB 補鈣鎂 (2L/公頃)	CUPORKBEST (2L/公頃) SUPABOR 肥果脆 (1L/公頃) 
Organic Activators 有機質	OM-3 黑三寶 (5L/公頃)		OM-3 黑三寶 (5L/公頃) 	OM-3 黑三寶 (5L/公頃)		
Plant Health Separate Appy. 植物保護資材		STANDSKH 矽寶 (25L/公頃) 		STANDSKH 矽寶 (25L/公頃)	STANDSKH 矽寶 (25L/公頃)	STANDSKH 矽寶 (25L/公頃)
Applications 施用次數	14 天 1 次, 共 2 次	每 21 天 1 次, 共 2 次	噴 1 次	噴 2 次	每 14-21 天噴 1 次, 共 3 次	噴 2 次

柑桔之施用法:

第一次抽春梢時以 250CC/分地每 21 日噴 1 次(共 2 次)-幼果期以 250CC/分地(噴 2 次)-肥大期到採收前以 250CC/分地,每 14 至 21 日噴 1 次(共 3 次)-採收後以 250CC/分地(噴 2 次)



矽寶-葡萄(grapes)使用方法-nutrition plan

Field Practices & Growth Stages	Past Harvest Sprays & Leaf Fall 採收後及落葉期	New Plantings & Re-Plants 新種及重種植	Bud Burst 萌芽期	Leaf Formation 3-4 Leaves 3-4 葉期	Berry Set 著果期	Bunch Closure 肥大期	Veraison 著色期
Major Elements 主要養分	MAGIC K 保全鉀 (4L/公頃) 	SUPA STAND PHOS 健立保 (6L/公頃) 	SUPA STAND PHOS 健立保 (6L/公頃)	MAGIC K 保祝勇或健立保 (4L/公頃)	SUPA K 30 保全鉀 (4L/公頃)	SUPA K 30 保全鉀 (4L/公頃)	SUPA K 30 保全鉀 (5L/公頃)
Trace Elements 次要養分	SUPA BOR (1L/公頃) 肥果脆 GROCAL MGB (3L/公頃) 補鈣鎂		SUPA BOR 肥果脆 (1L/公頃)	SUPA BOR (1L/公頃) 肥果脆 	GROCAL MGB (3L/公頃) 補鈣鎂 	GROCAL MGB (3L/公頃) 補鈣鎂	GROCAL MGB (3L/公頃) 補鈣鎂
Organic Activators 有機活化劑		OM-3 黑三寶 (4L/公頃)	OM-3 黑三寶 (4L/公頃) 	OM-3 黑三寶 (4L/公頃)	OM-3 黑三寶 (4L/公頃)		
Plant Health Separate Appy. 植物保護資材					STAND SKH 矽寶 (3L/公頃) 	STAND SKH 矽寶 (3L/公頃)	STAND SKH 矽寶 (3L/公頃)
Applications 施用次數	10 天 1 次， 共 2 次	14 天 1 次 共 2 次	1 次	14 天 1 次 共 2 次	14 天 1 次， 共 2 次	14 天 1 次， 共 2 次	14 天 1 次， 共 2 次

葡萄施用法:

著果期以300CC/分地,每14日噴1次,共2次,肥大期以300CC/分地每14日噴1次,共2次,著色期每14日以300CC/分地噴1次,共2次,採收後至落葉期以300CC/分地每10日噴1次,共2次)



矽寶-芒果(mango)使用方法-nutrition plan

Field Practices & Growth Stages	Past Harvest 採收後	Pre-Flowering 開花前	Flowering & Fruit Set- Early Development 開花期及著果期	Fruit Fill 肥大期	Late Fruit Fill to Harvest 著果期全採收
Major Elements 主要養分	MAGIC K (5L/公頃)	SUPA STAND PHOS (5L/公頃) <u>健立保</u> MAGIC K (5L/公頃) <u>保祝勇</u>		SUPA K 30 <u>保全鉀</u> (5L/公頃)	SUPA K 30 <u>保全鉀</u> (6L/公頃)
Trace Elements 次要養分	SUPA BOR (1L/公頃) <u>肥果脆</u> GROCAL MGB (3L/公頃) <u>補鈣鎂</u> CUPOR K BEST (1L/公頃)	SUPA BOR (1L/公頃) <u>肥果脆</u> CUPOR K BEST (1L/公頃)	GROCAL MGB (3L/公頃) <u>補鈣鎂</u>	GROCAL MGB (3L/公頃) <u>補鈣鎂</u>	GROCAL MGB (3L/公頃) <u>補鈣鎂</u>
Organic Activators 有機質		OM-3 <u>黑三寶</u> (4L/公頃)	OM-3 <u>黑三寶</u> (4L/公頃)	OM-3 <u>黑三寶</u> (4L/公頃)	
Plant Health Separate Appy. 植 物保護資材	STAND SKH <u>矽寶</u> (3L/公頃)	STAND SKH <u>矽寶</u> (3L/公頃)		STAND SKH <u>矽寶</u> (3L/公頃)	
Applications 施用 次數	1 次	14 天 1 次 共 2 次	1 次	14 天 1 次 共 2 次	14 天 1 次 共 2 次

芒果之施用法:開花前以300CC/分地每14日噴1次,共2次,肥大期以300CC/分地每14日噴1次,共2次,採收後以300CC/分地噴1次



矽寶-草莓(Strawberry)使用方法-nutrition plan

Field Practices & Growth Stages↵	Planting ↵	Plant Establishment↵	Leaf & Crown Growth↵	<u>Pre Flowering-Fruit Formation</u> ↵	Fruit Fill ↵
Major Elements 主要養分↵	SUPA STAND PHOS↵ (6L/公頃)↵	MAGIC K (4L/公頃)↵ <u>保祝勇</u> ↵	MAGIC K↵ 保鉀健↵ (4L/公頃)↵	MAGIC K↵ 保鉀健↵ (4L/公頃)↵	SUPA K 30↵ <u>保全鉀</u> ↵ (2L/公頃)↵
Trace Elements 次 要養分↵	↵	SUPA BOR (0.5L/公頃)↵ <u>肥果脆</u> ↵ ↵	GROCAL MGB↵ (2L/公頃)↵ <u>補鈣鎂</u> ↵ CUPOR K BEST↵ (2L/公頃)↵	GROCAL MGB↵ (2L/公頃)↵ <u>補鈣鎂</u> ↵ SUPA BOR↵ (1L/公頃)↵ <u>肥果脆</u> ↵	GROCAL MGB↵ (3L/公頃)↵ <u>補鈣鎂</u> ↵
Organic Activators 有機質↵	↵	OM-3↵ <u>黑三寶</u> ↵ (5L/公頃)↵	OM-3↵ <u>黑三寶</u> ↵ (5L/公頃)↵	↵	↵
Plant Health Separate Appy. 植 物保護資材↵	↵	↵	STAND SKH↵ <u>矽寶</u> ↵ (3L/公頃)↵	↵	↵
Applications 施用 次數↵	14 天 1 次↵ 共 2 次↵	14 天 1 次↵ 共 2 次↵	14 天 1 次↵ 共 2 次↵	14 天 1 次↵ 共 2 次↵	14 天 1 次, ↵

草莓之施用法:生長期以300CC/分地美14日噴1次