

黑三寶

OM-3



- 您的農田、果園是否土質不好？缺乏有機質？土壤濕冷？您的作物幼苗是否衰弱，有移植障礙、生長不好？是否葉片薄弱、碳水化合物含量低、易受霜害、熱害、乾害、溼害、藥害之影響嗎？
- 澳洲農化液體肥料公司提供您解決的祕方—請施用「黑三寶」(OM-3)，因為它含有30%最高品質之南非特殊海草經新鮮萃取之特殊海草精，可先促進生根，再促進莖葉生長，含有30%由魚精萃取之特殊高能量胺基酸及養分及30%精純提煉之最佳腐植酸，促進各種肥份之有效率吸收。故可使作物根系旺盛、莖葉肥厚、健康、耐寒、耐熱、耐旱、耐溼及抗病力強。可以以400~800倍行葉面噴施或500~1000倍行根部灌注，開根，生長、肥壯效果明顯。



作物幼苗常因土質、氣候因素根系衰弱，造成生長不一致，或死亡缺株



剛移植之幼苗的根需要荷爾蒙的刺激才能開展



「黑三寶」之海草精係採用南非特殊海草不脫水、不加熱、不冷凍，無化學處理，新鮮萃取




此種特殊海草精其生長素是細胞分裂素之330倍濃度，因為可先刺激根的生長後，再長莖葉



灌注及噴施此特殊海草精之作物根系比對照區更特別旺盛




即使受線蟲寄生，灌施此海草精之根系比對照區更能繼續生長，不受線蟲影響




噴施此特殊海草精之葉片比對照區肥厚，澱粉含量高




所含30%之精純腐植酸，可以改良土壤，保持土壤水份，釋出被固定的磷肥，增加養分之吸收，促進根的生長，刺激土中微生物的活性




所含30%魚精胺基酸供給天然之氮肥，是製造蛋白質的單元，可提升作物的能量，並餵飼土中微生物，增加養分之利用率



當「黑三寶」以每分地1公升的量加入土中，土中微生物之活性增加400%，係以土中二氧化碳之釋放量測量



左邊噴施「黑三寶」之葡萄不受寒害影響，著果多，無凍傷，對照區著果少，有凍傷。



左邊噴施「黑三寶」之葡萄產量好，糖度高，耐霜害



國外製造工廠：

Agrichem Liquid Fertilizer PTY LTD.
2 Hovey Rd, QUEENSLAND 4207 Australia



代理進口商：名方有限公司

台北市昆明街269號 Tel:02-2719-9430

<http://www.twphartr.com.tw>

或請上網鍵入「名方有限公司」搜尋公司網站

黑三寶 OM-3

「黑三寶」之特點：

1. 黑三寶 (OM-3) 含有30%南非特殊新鮮萃取之海草精，其生長素 (Auxin) 是細胞分裂素 (Cytokinin) 之330倍，故可促進根群旺盛，再促進莖葉繁茂、肥厚，生長快，產量高，更耐逆境。
2. 其所含30%之高能量魚精胺基酸，養分高，作物生長快，產量高，品質好，並可提高土壤中微生物之數量、活性。
3. 其所含30%之精純腐植酸可以改良土壤，釋出被固定之磷、鉀、鈣、鎂，活化土中微生物及促進葉面養分之吸收。
4. 它可以策略性地以土壤灌注或葉面噴施應用於作物之某一特別階段，如移植後之根部澆灌或葉面噴施，促進生根，也可以在作物生長期中定期施用。

「黑三寶」之成份：

全氮：2%(w/w)	全磷酐：1.4%(w/w)	水溶性鐵：0.006%(w/w)
全氧化鉀：2.5%(w/w)	腐植酸鉀：4%(w/w)	水溶性錳：0.006%(w/w)
有機質 (可溶性固體)：35.4%(w/v)	全銅：0.004% 40(mg/kg)	另含天然生長素、細胞分裂素、胺基酸、維他命及微量元素。

「黑三寶」之用法：

果樹類：以葡萄為例

各生長階段之田間施肥	採收後至落葉期	新種或重種園	萌芽期	3~4葉期	著果期	肥大期	著色期
三要素液肥	健立保或保祝勇 0.4公升/分地	健立保或保祝勇 0.6公升/分地	健立保或保祝勇 0.6公升/分地	健立保或保祝勇 0.4公升/分地	保全鉀 0.4公升/分地	保全鉀 0.4公升/分地	保全鉀 0.5公升/分地
次微量元素液肥	肥果脆 0.1公升/分地 補鈣鎂 0.3公升/分地	-	肥果脆 0.1公升/分地	肥果脆 0.1公升/分地	補鈣鎂 0.3公升/分地	補鈣鎂 0.3公升/分地	補鈣鎂 0.3公升/分地
有機活化液肥	-	黑三寶 0.4公升/分地	黑三寶 0.4公升/分地	黑三寶 0.4公升/分地	黑三寶 0.4公升/分地	-	-
保健液肥	銅甲意 0.2公升/分地 矽寶 0.3公升/分地	-	-	-	矽寶 0.3公升/分地	矽寶 0.3公升/分地	矽寶 0.3公升/分地
用法	每14天噴一次 共二次	每14天噴一次 共二次	噴一次	每14天噴一次 共二次	每14天噴一次 共二次	每14天噴一次 共二次	每14天噴一次 共二次

蔬菜類：以高麗菜 (甘藍) 為例

各生長階段之田間施肥	移植期	生長期	結球期
三要素液肥	健立保或保祝勇0.5公升/分地	健立保或保祝勇0.5公升/分地	保甲健或保全鉀0.5公升/分地
次微量元素液肥	-	肥果脆0.1公升/分地 補鈣鎂0.3公升/分地	補鈣鎂0.3公升/分地
有機活化液肥	-	黑三寶0.5公升/分地	-
保健液肥	-	銅甲意0.1公升/分地 矽寶0.3公升/分地	矽寶0.3公升/分地
用法	每10天噴一次，共二次	每10天噴一次，共二次	每10天噴一次，共二次

- 注意事項：1. 「矽寶」之鹼性較高，與其他農藥或肥料混合時，請先將「矽寶」在大水缸稀釋800倍以上，各種要混合之藥品、肥料先在小水桶稀釋後，再逐一加入。
2. 「保全鉀」請勿與銅劑混合同時噴施，以免因銅離子化，造成銅之傷害。
3. 如欲以「黑三寶」「保全鉀」預防寒害，請於寒流來襲前三~六日，加強以500倍噴施「黑三寶」或「保全鉀」。
4. 如欲以「補鈣鎂」「矽寶」預防落果及裂果，請於下大雨後二~三日，加強以500倍噴施「補鈣鎂」1000倍噴施「矽寶」。