

健立保

免登記植物保護資材

植保進字第00086號

SUPA STAND PHOS



用法:

幼苗期適合施用1號配方/生長期、成株及結果期適合施用2號配方

作物	病害	使用濃度	施用方法
水稻育苗	立枯病	400-1000 倍	播種後隨即灌注液再行覆土
網室蔬菜、芋頭、蔬菜、瓜類 [番茄、甜椒、茄子、甘藍、菠菜、胡瓜、苦瓜、西瓜、香瓜、草莓等]	猝倒病 疫病 露菌病	400-1000 倍	每隔7天噴施1次，連續2-3次，下雨前後特別噴施。
果樹 (柑橘、檸檬、文旦、木瓜、酪梨、百香果、鳳梨、蓮霧、番石榴等)	流膠病 萎凋病 疫病 心腐病 露菌病	400-800 倍	雨季前，每月施用2次行葉面散布及根部灌注。
花卉 [蘭花、百合、火鶴花、非洲菊、海芋、大岩桐等]	猝倒病 萎凋病 疫病 露菌病	400-1000 倍	雨季前每隔7天噴施1次，連續2-3次。下雨前後特別噴施。

注意事項

- 噴施後1-2日內即可吸收，並上下移行，作物3~7日內可產生免疫力。
- 作物免疫力之持久性依作物生長快慢及病害程度而異，生長愈快，其亞磷酸被稀釋愈多，因此要增加噴施次數，一般蔬菜生長快，約每隔7日噴施1次；果樹約7-30日噴施1次，依其生長快慢而定。
- 「健立保1號」較適用於蔬菜、果菜、花卉之幼苗期施用；「2號」較適用物之成株施用，因其所含之各種成分較高。
- 為迅速達到防治病害效果，根部病害可以用灌注方法，葉面病害可以用撒布方法施藥，並可以和鋅錳乃浦、四氯異苯晴、甲基鋅浦乃、貝芬替、免賴得等殺菌劑混合施用。
- 請勿與礦物油、氫氧化銅、波爾多液等農藥混合施用。三種以上農藥混合，請先少量試驗，如不產生沉澱、變化才可使用。
- 請貯藏於陰涼處，避免強光直接照射及兒童觸及。

健立保1號:

肥料品目 (編號)-液態複合肥料(6-06)
肥料登記證字號-肥進複字第0053031號

健立保2號:

肥料品目 (編號)-
液態雜項次量微量要素肥料(4-42)
肥料登記證字號-
肥進微字第0053078號

成分:	1號 (w/w)	2號 (w/w)	1號 (w/w)	2號 (w/w)
• 全氮-----	4%	4%	鎂-----	0.080%
• 水溶性磷酐-----	16%	28%	鉍-----	0.0317%
• 水溶性氧化鉀-----	2%	10%	鐵-----	0.023%
• 海藻精-----	8-13%	8.13%	錳-----	0.0158%
• 有機萃取物-----	8-13%	8-13%	硼-----	0.0138%
• 硫-----	0.813%	0.813%	銅-----	0.002%
• 鋅-----	0.317%	0.317%	鈷-----	0.001%

